

Paradoxe des anniversaires

Énoncé

- Quelle est la probabilité qu'au moins deux personnes aient leur anniversaire le même jour dans un groupe de 40 personnes ?

Solution

Il est plus simple de passer par le calcul de la probabilité complémentaire $P_{comp}(N)$, que toutes les N personnes présentes aient leur anniversaire des jours différents. Si on considère une personne à la fois, on multipliera les probabilités indépendantes d'"avoir un anniversaire un jour différent des personnes précédentes" :

- $P_{comp}(1) = 1 = 365/365$ (trivial pour une seule personne)
- $P_{comp}(2) = (365/365) * (364/365)$ (pour la deuxième personne, seuls 364 jours sur 365 sont adéquats pour avoir des dates différentes)
- $P_{comp}(3) = p_{comp}(2) * (363/365) = 1 * (364/365) * (363/365)$ (pour la troisième personne, seuls 363 jours sur 365 sont adéquats pour avoir des dates différentes)
- ...
- $P_{comp}(N) = (365 * 364 * 363 * \dots * (365 - N + 1)) / (365)^N = (365)! / ((365-N)! * (365)^N)$

Pour 40 personnes, la réponse $1-P_{comp}(40) = 0.89123$

Remarque : discuter de la non-validité de l'approximation de Stirling utilisée.

Programme Python

```
<sxh python;>#!/usr/bin/python # -*- coding: UTF-8 -*- """
Petit programme destiné à répondre à la question suivante : - Quelle est la probabilité qu'au moins deux personnes aient leur anniversaire le même jour dans un groupe de 40 personnes. Hypothèses : l'année fait 365 jours et les naissances des personnes se distribuent uniformément (pas de jumeaux,...) Remarque : la solution doit pouvoir être généralisée ! """

```

```
from math import log, exp

# nombre de possibilités différentes # (= nombre de jours d'une année dans les exemples) poss=365

# nombre d'items (personnes présentes) n=40

# solution : p = poss ! / ( (poss-n) ! * poss^n)

pcomp=1. for i in range(poss, poss-n, -1):

    pcomp=pcomp*i/poss
```

```
print "calcul exact : ",pcomp, 1.-pcomp

# calcul suivant l'approximation de Stirling ( ln(j!) ~= j ln(j) - j # l'approximation est d'autant plus valable que poss est grand et n << poss pcomps=exp(poss*log(poss)-poss - (poss-n)*log(poss-n) +(poss-n) - n*log(poss))

print "Approximation de Stirling : ",pcomps, 1.-pcomps </sxh>
```

Problème analogue

- Quelle est la probabilité de recevoir 40 cartes cadeaux différentes (aucun “double”) sur 216 types différents de cartes distribuées comme jeu-concours aux caisses d'un supermarché
- Si ce genre d'événement se produit fréquemment, que pouvez-vous en conclure ?
- Discuter des stratégies appliquées par les personnes qui organisent ce genre de jeu-concours

Références

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_des_anniversaires
- http://en.wikipedia.org/wiki/Birthday_problem
- https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/7l9ef7/i_simulated_and_animated_500_instances_of_the/, simulation

From:
<https://dvillers.umons.ac.be/wiki/> - Didier Villers, UMONS - wiki



Permanent link:
https://dvillers.umons.ac.be/wiki/teaching:exos:paradoxe_anniversaires?rev=1514047315

Last update: **2017/12/23 17:41**