2025/12/05 23:09 1/3 Paradoxe des anniversaires

Paradoxe des anniversaires

Énoncé

• Quelle est la probabilité qu'au moins deux personnes aient leur anniversaire le même jour dans un groupe de 40 personnes ?

Solution

Il est plus simple de passer par le calcul de la probabilité complémentaire Pcomp(N), que toutes les N personnes présentes aient leur anniversaire des jours différents. Si on considère une personne à la fois, on multipliera les probabilités indépendantes d'"avoir un anniversaire un jour différent des personnes précédentes" :

- Pcomp(1) = 1 = 365/365 (trivial pour une seule personne)
- Pcomp(2) = (365/365) * (364/365) (pour la deuxième personne, seuls 364 jours sur 365 sont adéquats pour avoir des dates différentes)
- Pcomp(3) = pcomp(2) * (363/365) = 1 * (364/365) * (363/365) (pour la troisième personne, seuls 363 jours sur 365 sont adéquats pour avoir des dates différentes)
- ..
- $Pcomp(N) = (365 * 364 * 363 * ... * (365 N + 1)/ (365)^N = (365)! / ((365-N)! * (365)^N)$

Pour 40 personne, la réponse 1-Pcomp(40) = 0.89123

Remarque : discuter de la non-validité de l'approximation de Stirling utilisée.

Programme Python

multiples-occurences-anniversaires.py

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-
"""

Petit programme destiné à répondre à la question suivante :
- Quelle est la probabilité qu'au moins deux personnes aient leur anniversaire
le même jour dans un groupe de 40 personnes.
Hypothèses : l'année fait 365 jours et les naissances des personnes se distribuent uniformément (pas de jumeaux,...)
Remarque : la solution doit pouvoir être généralisée !
"""

from math import log, exp
# nombre de possibilités différentes
```

19:17

```
# (= nombre de jours d'une année dans les exemples)
poss = 365
# nombre d'items (personnes présentes)
n = 40
# solution : p = poss ! / ( (poss-n) ! * poss^n)
pcomp = 1.
for i in range(poss, poss-n, -1):
    pcomp = pcomp * i / poss
print("calcul exact : ", pcomp, 1.-pcomp)
# calcul suivant l'approximation de Stirling (ln(j!) \sim j) in ln(j) - j
# l'approximation est d'autant plus valable que poss est grand et n <<
pcomps = exp(poss*log(poss)-poss - (poss-n)*log(poss-n) + (poss-n) -
n*log(poss))
print("Approximation de Stirling : ", pcomps, 1.-pcomps)
```

Problème analogue

- Quelle est la probabilité de recevoir 40 cartes cadeaux différentes (aucun "double") sur 216 types différents de cartes distribuées comme jeu-concours aux caisses d'un supermarché
- Si ce genre d'événement se produit fréquemment, que pouvez-vous en conclure ?
- Discuter des stratégies appliquées par les personnes qui organisent ce genre de jeu-concours

Références

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe des anniversaires
- http://en.wikipedia.org/wiki/Birthday problem
- https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/7l9ef7/i_simulated_and_animated_500_insta nces of the/, simulation
- Using the birthday paradox to teach probability fundamentals What are the odds that two of your friends share a birthday? Cassie Kozyrkov, Medium, 08/10/2019

https://dvillers.umons.ac.be/wiki/ - Didier Villers, UMONS - wiki

Permanent link:

https://dvillers.umons.ac.be/wiki/teaching:exos:paradoxe_anniversaires?rev=1570987031

Last update: 2019/10/13 19:17



2025/12/05 23:09 3/3 Paradoxe des anniversaires